
POLIKLINIKA
KNEZOVIĆ

LASERSKA KOREKCIJA VIDA ZA NEZNALICE





ŠTO JE DIOPTRIJA?

UKRATKO O LASERSKOJ KOREKCIJI VIDA

ŠTO TREBAM ZNATI PRIJE PREGLEDA ZA LASERSKU KOREKCIJU VIDA?

DA LI SAM DOBAR KANDIDAT ZA LASERSKU KOREKCIJU VIDA?

ŠTO TREBAM ZNATI PRIJE ZAHVATA?

ŠTO TREBAM ZNATI POSLIJE ZAHVATA?

UVOD

Htjeli biste se riješiti naočala/ kontaktnih leća i čuli ste da je laserska korekcija vida Vaše najbolje rješenje? Za Vas smo napravili ovaj priručnik kako biste mogli donijeti najbolju odluku za Vaš vid.



Poliklinika Knezović je ustanova gdje Vas se svakog pacijenta cijeni, poštuje i voli. Ovdje niste samo broj nego čovjek kojem se pristupa s puno topline i želje da mu se pomogne.

Opremljeni smo vrhunskim dijagnostičkim uređajima kao npr. kompjuteriziranim mjeračima suznog filma, pupilometrima, topografima, tomografima, OCT-ima, optičkim biometrima i sl. Laserska platforma je od renomiranog i provjerenog njemačkog proizvođača Wavelight koji je vodeći u polju laserske kirurgije oka.


ŠTO JE DIOPTRIJA?


Dioptrija se može prepoznati po zamućenom ili zamagaljenom vidu. Uslijed zamagljenog vida osobe često "škiljite" i stiskaju oči kako bi izoštrile sliku što može dovesti do glavobolja.



1. Kratkovidnost ili miopija

Kratkovidnost ili miopija izražava se u minus dioptrijama. Kratkovidnost je refraktivna greška oka kod koje se slika predmeta fokusira ispred mrežnice te su nam zbog toga udaljeni predmeti mutni, dok su predmeti na blizinu jasni. Za pojavu kratkovidnosti najčešće je zaslužna genetika te preveliko naprezanja oka (čitanje na blizinu). Kratkovidnost možemo korigirati naočalama, kontaktnim lećama ili laserskom korekcijom vida.






2. Dalekovidnost ili hiperopija

Dalekovidnost ili hiperopija izražava se u plus dioptrijama. Dalekovidnost je refraktivna greška oka kod koje se slika predmeta fokusira iza mrežnice te zbog toga udaljene predmete vidimo jasnije dok je vid na blizinu mutan i nejasan. Javlja se već u ranom djetinjstvu iako često kod djece simptomi nisu izraženi ukoliko se ne radi o visokim dioptrijama. Ispravljamo ju naočalama i kontaktnim lećama, a u nekim slučajevima dalekovidnost je moguće riješiti i laserskom korekcijom vida.

3. Astigmatizam


Astigmatizam je stanje oka u kojem se svjetlosne zrake koje ulaze u oko ne lome jednako u svim meridijanima. Najčešći uzrok astigmatizma je ovalni oblik rožnice koja kod astigmatizma ima oblik odsječka ragbi lopte, umjesto oblika odsječka kugle, te zbog toga dioptrija ima različite vrijednosti u različitim meridijanima. Astigmatizam možemo podijeliti na:



1. Pravilni (regularni)
2. Nepravilni (iregularni)

Pravilni astigmatizam ispravljamo naočalama, kontaktnim lećama ili laserskom korekcijom vida.

Kod nepravilnog astigmatizma nepravilnosti se ne mogu povezati niti sa jednim geometrijskim oblikom. Najčešći uzrok ove refraktivne greške jesu bolesti rožnice (npr. keratokonus). Nepravilni astigmatizam ispravljamo posebnim kontaktnim lećama ili posebnim laserskim zahvatima uz koje dodatno učvršćujemo rožnicu (DISC protokol).



4. Dobna dalekovidnost


Dobna dalekovidnost obično se javlja nakon 40-te godine život. Prvi znakovi koji nam ukazuju na dobnu dalekovidnost su zamagljen vid pri čitanju sitnog teksta na blizinu te brzog umaranja oka prilikom čitanja. Do dobne dalekovidnosti dolazi zbog procesa starenje očne leće koja s godinama više nema mogućnost rastezanja. Ovu vrstu dioptrije najčešće korigiramo pomoću naočala, a u nekim situacijama se rješava kontaktnim lećama ili zamjenom intraokularne leće odnosno kirurškim zahvatom.



LASERSKA KOREKCIJA VIDA

Laserska korekcija vida (lasersko skidanje dioptrije) je operacija kod koje laser visoke preciznosti nježno remodelira rožnicu te tako otklanja dioptriju. Zahvat je siguran iz razloga što su današnji laseri točni u jednu dvadesetinu dioptrije i ne rade nikakav termalni učinak na podležeće tkivo.

Naravno, prije samog zahvata se mora napraviti detaljan specijalistički pregled na kojem ćete saznati jeste li kandidat za takvu vrstu procedure te ako jeste, preporučit ćemo Vam metodu koja najbolje odgovara Vašem oku. O samom pregledu i zahvatu možete saznati više u budućim poglavljima priručnika laserske korekcije vida za neznalice. Također, predstavit ćemo i metode laserske korekcije vida, pripremu prije operacije te postoperativni tijek cijeljenja tako da sa samopouzdanjem možete znati što Vas točno očekuje na svakom koraku.



Posebnu pažnju posvećujemo kvaliteti suznog filma jer je upravo to preduvjet dobrog rezultata nakon laserske korekcije vida. Jedini u ovom dijelu Europe koristimo specijalni uređaj za poboljšanje kvaliteta suznog filma Dry Eye koji djeluje na uzrok problema.


PREGLED ZA LASERSKU KOREKCIJU VIDA



Prije samog dolaska na predoperativni pregled za lasersku korekciju vida najbolje je naručiti se, telefonski ili putem e-maila, kako bismo mogli odvojiti i planirati vrijeme za Vas te Vam se u potpunosti posvetiti. Na pregledu ćemo Vam odgovoriti na sva pitanja i nedoumice u vezi laserske korekcije vida.

Pregled za lasersku korekciju vida traje 60 – 90 minuta. Prilikom dolaska na pregled počinjemo sa obradom oka (snimanje na nekoliko različitih aparata) kako bismo dobili što precizniju analizu oka.





Slijedi točno i precizno određivanje vidne oštrine za daljinu i za blizinu, utvrđivanje dubinskog vida te analiza suznog filma.

Zadnji korak je širenje zjenice (midrijaza). Zjenice proširujemo kapima koje kapamo u oči, a one blokiraju vaše mišiće te tako sprječavaju zjenicu da reagira na svjetlosne podražaje. Kada je zjenica proširena liječnik može pregledati i očnu pozadinu koja se sada jasnije vidi. Kada prikupimo sve potrebne analize Vašeg oka, preporučit ćemo Vam najprikladniju metodu laserskog skidanja dioptrije za Vaše oko.



Poželjno je da na pregled donesete sve naočale koje trenutno koristite, te ukoliko nosite kontaktne leće da imate sa sobom njihovu točnu dioptrijsku vrijednost.



VRSTA KONTAKTNIH LEĆA	IDEALNO VRIJEME PAUZE OD NOŠENJA K.L. PRIJE PREGLEDA
Meke kontaktne leće	10 dana
Torične meke kontaktne leće	14 dana
Polutvrde/ tvrde kontaktne leće	10-30 dana (ovisno o vremenu nošenja k.l.)

Nakon pregleda, vid će radi proširenih zjenica biti zamućeniji, stoga nije preporučljivo voziti automobil oko 2-3h. Upravo radi Vaše, a i naše sigurnosti, provodimo detaljnu predoperativnu analizu, kao dodatnu garanciju same laserske korekcije vida. Nakon precizne analize koju unosimo u softver lasera, svakog pacijenta vodimo individualno i posebno prilagođavamo zahvatu kako bismo postigli najbolji rezultat.

METODE LASERSKE KOREKCIJE VIDA

1. PRK



PRK ili fotorefraktivna keratektomija je vrsta laserske operacije za ispravljanje kratkovidnosti, dalekovidnosti i astigmatizma. PRK metoda je prva vrsta laserske operacije oka za korekciju vida i nudi brojne prednosti u usporedbi s ostalim metodama. PRK djeluje preoblikovanjem rožnice pomoću lasera, čime svjetlost koja ulazi u oko bude pravilno fokusirana na mrežnicu. Kod PRK metode tanki vanjski sloj rožnice (epitel) se uklanja različitim načinima, što ovu metodu dijeli na 3 podvrste:

1. PRK alkohol: uklanjanje epitela alkoholom

2. PRK brush: uklanjanje epitela mikrokirurškom četkicom (npr. Pallikarisova četkica)

3. Trans – PRK: uklanjanje epitela laserom

Epitel se regenerira (ponovno naraste preko površine rožnice) unutar nekoliko dana od operacije.

Prednosti PRK metode:

- Pogodno za pacijente s tankom rožnicom
- Minimalno invazivna za oko – posebno kod korištenja kirurške mikročetkice za skidanje epitela
- Nema vertikalnog reza - bolja biomehanika tkiva
- Dugoročno sigurno za oko



Nedostaci PRK metode:

- Malo sporiji oporavak tijekom prva 3 dana nakon operacije (ovisi i o vrsti PRK metode)

2. LASIK

LASIK (laser in situ keratomileusis) je danas najčešće izvođena vrsta zahvata za skidanje dioptrije. Čest je izbor kirurga najviše zbog odsutnosti nelagode u ranom postoperativnom periodu. Sama procedura se sastoji od dva koraka operacije, u prvom koraku formira se flap (poklopac na rožnici), a u drugom koraku se remodelira površina rožnice excimer laserom. Flap na rožnici se može formirati na dva načina:



1. LASIK s mikrokeratomom (standardni LASIK)
To je prva razvijena LASIK metoda gdje osim moderne tehnologije treba i iskusna ruka kirurga za formiranje flapa (poklopca na rožnici) uz pomoć mikrokeratoma (automatizirani električni nožić).

2. Femtosecond LASIK
Femto – LASIK (istoznačnice: ALL – Laser LASIK, Bladeless LASIK). To je vrsta LASIK metode koja umjesto korištenja mikrokeratoma za formiranje flapa koristi femtosekundni laser. Zbog veće preciznosti reza flapovi rožnice (poklopci na rožnici) pravilnijeg su oblika te predvidljivije debljine u odnosu na flapove napravljene mikrokeratomom.



Prednosti LASIK metode:

- Blaža postoperativna nelagoda tijekom prvih par dana nakon zahvata
- Bolji rezultati za plus dioptrije

Nedostaci LASIK metode:

- Uzrokuje potencijalne poteškoće vezane za suho oko
- Ponekad dovodi do rasipanja svjetlosti i haloa (sjena) oko izvora svjetlosti
- Slabija biomehanika tkiva u odnosu na PRK metodu
- Rijetke flap-related komplikacije

3. SMILE

SMILE, skraćenica za SmallIncisionLenticuleExtraction, koristi tehnologiju koju je razvio Carl Zeiss Meditec, Inc. za preoblikovanje tkiva. SMILE koristi femtosekundni laser za mikroskopski rez na površini rožnice te formiranje sićušnog tkiva u obliku leće kojeg kirurg odstrani.





Prednosti SMILE metode:

- Minimalno invazivna metoda
- Brzo cijeljenje

Nedostaci SMILE metode:

• slabiji rezultati za astigmatizam i plus dioptrije
• manjak dugoročnih studija vezanih za sigurnost i stabilnost rezultata nakon zahvata
• nemogućnost dokorekcije istom metodom (moguće PRK metodom)

JESAM LI KANDIDAT?

Za lasersku korekciju vida nisu svi idealni kandidati. Neki od najvažnijih pokazatelja da li ste dobar kandidat za lasersku korekciju vida su:

- Dob - osobe koje nisu navršile 18 godina starosti ne mogu se podvrgnuti laserskoj korekciji vida, ne samo radi toga što nisu punoljetni već zbog tga što je oko do te dobi još uvijek u procesu rasta i razvoja.

- Stabilnost dioptrije - potrebno je da dioptrija stagnira, odnosno da se ne mijenja/ ne „raste“ barem 12 mjeseci prije zahvata.

- Debljinu rožnice - kako bismo imali prostora za „skidanje“ dioptrije (ukoliko je npr. dioptrija visoka, a rožnica tanka- osoba nije kandidat za lasersku korekciju vida).

- Zakrivljenost rožnice.



ŠTO TREBAM ZNATI PRIJE ZAHVATA?

Nakon pregleda kojim smo ustanovili da ste kandidat za lasersku korekciju vida, slijedi i sam zahvat. Prije samog zahvata potrebno je znati kako i na što se pripremiti.

Vvažno je ne nositi meke kontaktne leće najmanje 10 dana prije zahvata, meke torične kontaktne leće najmanje 14 dana prije zahvata, dok bi za polutvrde leće idealno rješenje bila zamjena privremenim naočalama. Glavni razlog za to je taj da se oko oporavi, odnosno da se rožnica vrati u svoju normalnu zakrivljenost, a ujedno su i snimke analize rožnice točnije.

- Dugotrajnim nošenjem kontaktnih leća može se oslabiti suzni film odnosno prisutan je problem suhog oka, stoga je dobro prije zahvata koristiti umjetne suze bez konzervansa 2-3x dnevno barem 14 dana prije laserske korekcije vida. One će poboljšati suzni film i umiriti oko.

- Na Vaš dogovoreni termin laserske korekcije vida dođite sa pratnjom koja će isto tako i doći po Vas nakon što zahvat bude gotov.

- Obucite što komotniju odjeću u kojoj ćete se najudobnije osjećati. Isto tako je dobro doći oprane i čiste kose jer 5 dana nakon zahvata nije preporučljivo prati/ močiti glavu kako bi se izbjegla svaka mogućnost ulaska sapuna/ šampona/ vode u tek operirano oko.

Možete nam se sa sigurnošću prepustiti i doći bez straha jer će Vas u Poliklinici Knezović dočekati izvrstan I stručan tim koji će vas voditi kroz postupke zahvata. Ako u Vama postoji imalo straha i nesigurnosti, dobrovoljno ćete dobiti tabletu za smirenje u malim dozama koja će opustiti vaše mišiće te ćete i na samom zahvatu biti mirniji i suradljiviji.



TIJEK ZAHVATA



Prije samog zahvata provodi se finalna kontrola dioptrije. Zatim slijedi razgovor s kirurgom, koji će odgovoriti na sva Vaša pitanja i nedoumice.



Nakon razgovora potpisujete međunarodni informirani pristanak za lasersku korekciju vida kojim pristajete na operativni zahvat.



Medicinska sestra/ tehničar donijet će vam zaštitnu opremu (kapu za kosu i nazuvke koje idu preko obuće) sa kojom ulazite u operacijsku salu.



Nakon što uđete u operacijsku salu, liježete na kirurški stol gdje počinje ukapavanje anestetskih kapljica u oko. Riječ je o vrsti anestezije u kojoj nema uboda, igala i potpuno je bezbolna. U početku anestezija malo pecka, ali kroz svega nekoliko sekundi kad počne djelovati, peckanje više ne osjetite.

Na kapke se stavlja držač (blefarostat) koji Vam pomaže da ne trepćete i omogućuje da je oko otvoreno tijekom cijelog zahvata. Radi se oko po oko.





Cijeli postupak od početka pripreme do završetka traje svega 15-ak minuta, dok sam laser radi 5-15 sekundi.



Nakon što laser otkloni dioptriju, nekim se pacijentima na oko stavlja lijek Mitomicin C - antimetabolit koji smanjuje mogućnost nastanka haze-a (kratkotrajne mutnine na rožnici).



Odmah nakon laserske korekcije vida, u pratnji medicinskog osoblja, dolazite na provjeru vidne oštrine gdje će naši optometristi provjeriti koliko vidite nakon zahvata. U većini slučajeva je to odmah bolje nego što je bilo prije zahvata.

ŠTO MOŽETE OČEKIVATI NAKON ZAHVATA

Laserska korekcija vida koju ste mjesecima planirali konačno je gotova i sada čekate da čarolija počne - toliko očekivanu slobodu od vidnih pomagala. Nezaboravan trenutak je kada se ujutro probudite i po prvi put doživite oštar i neoštećen vid.



Imajte na umu da vaš vid može varirati u prvih nekoliko dana, ali postaje stabilniji tijekom sljedećih tjedana. Ovaj vodič je namijenjen da vas provede kroz ono što biste trebali, a što ne biste trebali raditi nakon laserske korekcije vida površinskim metodama.

Neposredno nakon zahvata

- Oko vas može peći, svrbjeti ili ćete osjećati kao da nešto ima u njemu.
- Možete osjetiti neku nelagodu ili u nekim slučajevima blagu bol zbog čega ćemo vam predložiti uzimanje blagog lijeka protiv bolova. Oba oka mogu suziti, a vid će vam vjerojatno biti maglovit ili mutan što je sasvim u redu jer je i to dio procesa.
- Instinktivno ćete poželjeti protrljati oko, ali nemojte! Trljanje oka moglo bi uzrokovati iritaciju ili pomaknuti terapijsku kontaktnu leću. Osim toga, možete osjetiti osjetljivost na svjetlost, odsjaj ili aureole oko svjetla, bjeloočnice mogu izgledati crvene ili krvave. Najbolje je da dugo odrijemate čim dođete kući. Drugim riječima, nema olimpijskog treninga, pisanja disertacije ili kasnonoćnog tulumarenja — samo odmor!



Ovi bi se simptomi trebali znatno poboljšati unutar prvih nekoliko dana nakon operacije. Trebali biste planirati nekoliko dana odmora dok se ti simptomi ne povuku. Svaki pacijent nakon operacije dobije otpusno pismo na osnovu kojeg može dobiti bolovanje u trajanju 7 do 10 dana. Bolovanje daje liječnik opće prakse. Ukoliko se radi o nekom poslu koji bi mogao štetno utjecati na oko, bolovanje se može produžiti.



terapija



Isti dan nakon zahvata počet ćete s redovitim ukapavanjem umjetnih suza bez konzervansa svakih sat vremena za liječenje osjećaja suhog oka. Koristit ćete i druge kapi za oči kao što su antibiotik- Tobrex i protuupalni lijek- Maxidex koji sprječava infekciju i upalu. Ono što preporučamo kao dodatak terapiji su Vitamin C i Omega 3 masne kiseline što je dobra kombinacija za oporavak oka.

kako se ponašati i što treba izbjegavati prvih nekoliko dana nakon zahvata

Rožnica je sada u procesu zacjeljivanja i postoji nekoliko stvari kojih morate biti svjesni u ranoj fazi zacjeljivanja i koje morate uključiti u svoju dnevnu rutinu. Vaš vid može varirati tijekom tog razdoblja uglavnom zbog ranih faza oporavka u procesu reepitelizacije (rasta novog epitelnog sloja). Cijeli proces se olakšava redovitom upotrebom propisane terapije kao i mirovanjem do prve kontrole. To će se poboljšati redovitom uporabom umjetnih suza bez konzervansa. Vrlo je bitno korištenje terapije koje je liječnik propisao, kao i mirovanje do prve kontrole.






Trebali biste pričekati do tri dana nakon operacije s izlaženjem iz svog doma, kako ne bi došlo do infekcije ili kako bi izbjegli mogućnost da vam nešto upadne u oko.

Savjetuje se odgoditi korištenje raznih losiona i krema oko očiju kako ne bi nastale postoperativne komplikacije ukoliko ti sastojci dospiju u oko.





Izbjegavajte prašinu, dim, kuhanje i sve tvari koje iritiraju oči.



NE trljajte oči nakon operacije.



Slično pripremnim fazama prije operacije, treba izbjegavati šminkanje očiju. Preporučamo da šminku ne nosite barem prva dva tjedna nakon operacije jer može izazvati iritaciju i upalu u fazi zacjeljivanja.

Do prve kontrole maksimalno izbjegavajte gledanje televizije, rad na računalu i korištenje sličnih tehnoloških uređaja (mobiteli).






Budite iznimno oprezni tijekom nošenja male djece, igranja s kućnim ljubimcima i sl. Ispravan oporavak zahtijeva povećanu pozornost pri dovršavanju zadataka koji riskiraju fizički udar u oko.

Izbjegavajte i ostale kemijske supstance (parfemi, lakovi za kosu, kemikalije za čišćenje..).





Držite sapun i vodu dalje od očiju. Možete se kupati ili tuširati normalno, no kosu i glavu ne perite do prve kontrole, a za umivanje koristite isključivo fiziološku otopinu ili flaširanu vodu.

Dobar način da ostanete hidrirani je da pijete puno vode. Ovo je uvijek dobra praksa, kad god je vaše tijelo pod stresom, primjerice nakon operacije, trebali biste povećati količinu vode koju pijete za nekoliko čaša dnevno. To će pomoći da područje oko očiju da ostanu lijepa i hidratizirana!



Prva kontrola

Četvrti dan nakon zahvata, posjetit ćete našu polikliniku na vašem prvom postoperativnom pregledu. Prilikom prve postoperativne posjete liječnik će vam ukloniti terapijske leće, ispitati vaš vid i pregledati oko na biomikroskopu kako bi potvrdili da vaše rožnice pravilno zacjeljuju.





Gotovo svatko će ovaj dan imati puno bolji vid, no ipak se savjetuje da zatražite pomoć od člana obitelji ili prijatelja da vas dovede na vaš pregled.

U ovom trenutku također možete razgovarati sa našim liječnikom o postoperativnim simptomima ako ih imate. Naše liječnike bi trebali posjetiti nekoliko puta u sljedećih 12 mjeseci. Iako možda mislite da vam je vid odličan, važno je da vas pregleda liječnik specijalist koji može lako spriječiti rijetke probleme čak i prije nego što se pojave.

Prva 2 tjedna nakon zahvata



Izbjegavajte plivanje u bazenu, odlazak u saune, kupanja u hidromasažnoj kadi, moru ili jezeru prva 2 tjedna.




Izbjegavajte naporne aktivnosti i tjelovježbu. Kontaktne sportove poput boksa, nogometa, karatea itd. trebate dozirati i konzumirati s većim dozama opreza najmanje 4 - 6 tjedana nakon operacije. Važno je zaštititi svoje oči od od svih nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta i potencijalne traume. Lagano trčanje ili tjelovježbu možete početi već 2 tjedna od operativnog zahvata.



Tuširajte se normalno, ali pokušajte držati sapun, šampon, regenerator i druge kemikalije podalje od očiju još neko vrijeme.



Vozite, ali samo ako vam liječnik kaže da imate „zeleno svjetlo“.



Vratite se normalnoj radnoj rutini, sve dok to ne uključuje napornu tjelesnu aktivnost. Ako koristite računalo, često se odmarajte i kapajte oči umjetnim suzama.

Mjesec dana nakon zahvata


Nakon 1. mjeseca trebali biste imati još jedan kontrolni pregled u našoj poliklinici. Ako je očekivani oporavak uspješan, vaše oči bi trebale biti mirne i bez iritacije. Kod manjeg broja pacijenata vidna oštrina može još malo oscilirati te se razbistriti u sljedećih nekoliko dana. Definitivno ste na dobrom putu prema potpunom oporavku i boljem vidu. Vratite se svojoj standardnoj rutini vježbanja i sportovima kojim ase bavite.



Šest mjeseci nakon zahvata

- Nakon šest mjeseci, vi i vaš liječnik razgovarat ćete o tome koliko često ćete trebati kontrolne preglede.


- Veoma je važno pratiti sve upute koje vam je liječnik dao i redovito obavljati postoperativne kontrole.



- Također biste trebali nositi sunčane naočale s UV zaštitom tijekom sunčanih dana tijekom prvih 12 mjeseci nakon operacije. Zapravo, dobra je ideja redovito nositi sunčane naočale. Izlaganje UV svjetlu vašim očima može s vremenom uzrokovati stvaranje pterigija (vanjske mrene) ili katarakte (sive mrene).

Evo nas i na kraju vaše faze oporavka. Uspio/la si!

Razlog zbog kojeg smo uključili šest mjeseci u liniju oporavka je taj što vaše oči zacjeljuju sve do šestog mjeseca. Za veliku većinu pacijenata rijetke nuspojave laserske korekcije vida (iritacija, poteškoće s vožnjom noću, osjetljivost na svjetlo, odsjaj, itd.) trebale bi se stabilizirati do ove točke.



Ako osjetite bilo kakvu bol, nelagodu, ispad u vidnom polju, crvenilo oka ili bilo koji drugi neuobičajeni simptom trebate se odmah obratiti svom liječniku. Bez obzira na lasersku korekciju vida preporučamo kontrolu očiju jednom u godini dana.



Hvala Vam na povjerenju. Bilo nam je zadovoljstvo biti uz Vas na svakom koraku i gledati Vas kako uživate u svom novom vidu. Uvijek ćemo biti tu za Vas.
Do idućeg susreta!